

No.	性別	年齢 (歳代)	各有害事象発現 時の 本剤投与量(mg)	有害事象名	重篤性	転帰	本剤投与開始から 事象発現までの期間	原疾患・合併症
11	女性	80	- 150	大腸穿孔 胃腸炎	重篤 重篤	死亡 回復	635日(中止528日目) 49日	関節リウマチ 骨粗鬆症 腰部脊柱管狭窄症 甲状腺機能低下症 子宮癌(既往歴)
12	女性	60	150 150 150	肺炎 口渇 感覚鈍麻	重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復	120日 99日 99日	関節リウマチ 感覚鈍麻 口内乾燥 間質性肺疾患(既往歴) 肺炎(既往歴)
13	男性	70	100	細菌性肺炎	重篤	回復	58日	関節リウマチ 十二指腸潰瘍 尿路結石 肝機能異常 腎機能障害
14	女性	60	150	細菌性肺炎	重篤	回復	138日	関節リウマチ 気管支炎 胃炎 不眠症 非定型マイコプラズマ感染 慢性気管支炎
15	女性	70	50 50 50 150 150 100	胃腸出血 嚥下障害 尿路感染 血便排泄 下痢 関節痛	重篤 重篤 重篤 重篤 重篤 非重篤	死亡 未回復 未回復 未回復 未回復 軽快	185日 181日 181日 62日 62日 10日	関節リウマチ 脂質異常症 高血圧 2型糖尿病 高尿酸血症 脳梗塞 間質性肺疾患(既往歴) ラクナ梗塞(既往歴) 腎機能障害(既往歴) 尿路感染 胃腸出血 糖尿病 骨粗鬆症
16	女性	40	100 50	細菌性肺炎 腎性貧血	重篤 重篤	回復 回復	110日 71日	関節リウマチ 顕微鏡的多発血管炎 腎機能障害 慢性腎臓病 腎性貧血
17	男性	不明	150	インフルエンザ	重篤	回復	32日	関節リウマチ 慢性腎臓病
18	女性	70	150 50	サイトメガロウイルス感染 傾眠	重篤 非重篤	回復 軽快	92日 -	関節リウマチ 高脂血症
19	女性	80	100 100 100 100	腎盂腎炎 急性心不全 マラスムス 心肺停止	重篤 重篤 重篤 重篤	回復 死亡 死亡 死亡	99日 287日(再投与148日) 287日(再投与148日) 287日(再投与148日)	関節リウマチ 高血圧 慢性腎臓病 高脂血症 腎機能障害 糖尿病性腎症 認知症 骨粗鬆症
20	女性	80	100 100 100	処置後感染 尿路感染 リンパ球数減少	重篤 重篤 非重篤	死亡 回復 回復	550日 92日 169日	関節リウマチ 腎機能障害 腎結石症 骨粗鬆症 甲状腺機能低下症
21	女性	70	100	尿路感染	重篤	回復	598日(増量後457日)	関節リウマチ 高血圧 慢性副鼻腔炎 脂質異常症
22	男性	70	- 150 150	心筋梗塞 肺炎 誤嚥性肺炎	重篤 重篤 重篤	死亡 回復 死亡	991日(再投与807日目) 162日 -	腎障害 関節リウマチ 水痘(既往歴) 糖尿病 間質性肺疾患(既往歴)
23	男性	70	150	腎盂腎炎 不整脈 心筋梗塞	重篤 重篤 重篤	軽快 死亡 死亡	36日 60日 60日	関節リウマチ 慢性閉塞性肺疾患 高血圧 肺気腫 狭心症 腎機能障害
24	女性	80	- 150 150	肺炎 胃潰瘍 出血性胃潰瘍	重篤 重篤 重篤	死亡 回復 回復	921日 119日 129日	関節リウマチ 喘息 間質性肺疾患 気管支拡張症 腎機能障害 B型肝炎ウイルス検査陽性(既往歴) 腸憩室
25	男性	70	50 50	細菌性肺炎 末梢性浮腫	重篤 非重篤	不明 不明	139日 36日	関節リウマチ 糖尿病 副鼻腔炎 難聴 白内障 脊椎圧迫骨折 腰部脊柱管狭窄症 深部静脈血栓症

No.	性別	年齢 (歳代)	各有害事象発現 時の 本剤投与量(mg)	有害事象名	重篤性	転帰	本剤投与開始から 事象発現までの期間	原疾患・合併症
26	女性	70	- 150	心内膜炎 非定型マイコプラズマ感染	重篤 重篤	死亡 不明	771日(中止675日) 97日	関節リウマチ 慢性腎臓病 骨粗鬆症 胃食道逆流性疾患 非定型マイコプラズマ感染 腎機能障害 肺炎
27	男性	40	150	肺炎	重篤	回復	180日	関節リウマチ 季節性アレルギー 結核 腎機能障害 腎硬化症 脂質異常症
28	女性	不明	100	肺炎	重篤	不明	-	関節リウマチ
29	女性	70	150 100	肺炎 尋麻疹	重篤 非重篤	回復 回復	57日 429日	関節リウマチ
30	女性	60	- 50 50 50 100	肺炎 咽頭炎 倦怠感 顆粒球数減少 扁桃炎	重篤 非重篤 非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復 不明 回復	96日(中止2日目) 35日 35日 - 203日	関節リウマチ 喘息 高血圧 胃食道逆流性疾患 骨粗鬆症 腰部脊柱管狭窄症 腎機能障害 帯状疱疹(既往歴) 水痘(既往歴)
31	女性	60	150 150 150 -	レンサ球菌感染 感染性腸炎 下痢 鉄欠乏性貧血	重篤 重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復 回復	18日 8日 8日 379日(中止363日目)	関節リウマチ 高コレステロール血症 骨粗鬆症 シェーグレン症候群 心筋梗塞 胃潰瘍 頭蓋内動脈瘤
32	女性	70	-	虫垂炎	重篤	回復	690日(中止263日)	関節リウマチ 肝炎ウイルスキャリアー
33	女性	80	125	肺炎	重篤	回復	296日	関節リウマチ 骨粗鬆症 低カリウム血症 慢性腎臓病 腎性貧血 腎機能障害
34	女性	60	- 150 150 -	真菌性副鼻腔炎 口渇 顎下腺腫大 ニューモシスチス・イロベチ肺炎	重篤 非重篤 非重篤 重篤	不明 回復 軽快 軽快	- - - 457日(中止423日)	関節リウマチ 慢性腎臓病 脂質異常症 腰部脊柱管狭窄症 高血圧 便秘 慢性胃炎 肝機能異常 腎機能障害
35	女性	不明	-	涙囊炎	重篤	不明	-	-
36	女性	70	100	肺炎	重篤	回復	115日	関節リウマチ 糖尿病 高血圧 骨粗鬆症 胃食道逆流性疾患 アレルギー性皮膚炎 帯状疱疹(既往歴)
37	男性	70	150 150 150	肺炎 高血圧 上咽頭炎	重篤 非重篤 非重篤	回復 不明 回復	192日 32日 88日	関節リウマチ 骨粗鬆症
38	女性	70	150 - - -	イレウス B型肝炎再活性化 関節リウマチ 腰部脊柱管狭窄症	重篤 重篤 重篤 重篤	回復 回復 回復 回復した が後遺症 あり	34日 272日(中止115日目) 272日(中止115日目) 359日(中止117日目)	関節リウマチ 喘息 脂質異常症 高血圧 結腸癌(既往歴) 間質性肺疾患(既往歴) 胃潰瘍(既往歴) 帯状疱疹(既往歴) 水痘(既往歴) B型肝炎(既往歴) 脊椎圧迫骨折 腰部脊柱管狭窄症
39	男性	70	100	肺炎	重篤	回復	141日	関節リウマチ 潜伏結核
40	女性	60	150 150 150 150 150 150 - -	好中球数減少 白血球数減少 リンパ球数減少 腎機能障害 痔核 鉄欠乏性貧血 大腸穿孔 腹膜炎	非重篤 非重篤 非重篤 重篤 非重篤 非重篤 重篤 重篤	回復 回復 回復 軽快 回復 回復 回復 回復	46日 46日 46日 25日 21日 25日 378日 378日	関節リウマチ 高血圧 骨粗鬆症 胃食道逆流性疾患 深部静脈血栓症 帯状疱疹(既往歴) 非定型マイコプラズマ感染(既往歴) 腎機能障害 貧血
41	男性	90	100	肺炎	重篤	回復	188日	関節リウマチ 腎機能障害 末梢性ニューロパシー 水痘(既往歴) HBV感染(既往歴)

No.	性別	年齢 (歳代)	各有害事象発現 時の 本剤投与量(mg)	有害事象名	重篤性	転帰	本剤投与開始から 事象発現までの期間	原疾患・合併症
42	女性	50	50	蜂巣炎	重篤	軽快	98日	関節リウマチ 低カリウム血症 鉄欠乏性貧血 帯状疱疹(既往歴) 間質性肺疾患(既往歴)
43	男性	70	50 50 100 50	肺炎 気管支炎 血中アルカリホスファターゼ増加 肝酵素上昇	重篤 重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 軽快 未回復	9日 9日 - 143日	関節リウマチ 心房細動 僧帽弁閉鎖不全症 副腎機能亢進症 腎癌(既往歴) 腎機能障害 慢性腎臓病
44	女性	70	150 -	倦怠感 細菌性肺炎	非重篤 重篤	回復 死亡	43日 962日(中止920日)	関節リウマチ 原発性胆汁性胆管炎 非定型マイコプラズマ感染
45	男性	80	50 - - 100 100	気胸 ニューモシスチス・イロペチ肺炎 骨髄抑制 心不全 脱水	重篤 重篤 重篤 重篤 非重篤	回復 死亡 死亡 未回復 回復	120日 885日 909日 864日 877日	腎機能障害 関節リウマチ 間質性肺疾患 リンパ球数減少 胸膜炎 血中β-D-グルカン陽性(既往歴) 胸水 大動脈弁閉鎖不全症
46	女性	不明	- -	発熱 感染	重篤 重篤	不明 不明	- -	関節リウマチ
47	男性	90	100	肺性心 窒息 誤嚥性肺炎	重篤 重篤 重篤	死亡 死亡 死亡	61日 61日 61日	関節リウマチ 高血圧 肺炎(既往歴)
48	女性	80	150 150 150 - - -	動悸 悪心 倦怠感 間質性肺疾患 間質性肺疾患 骨髄炎	非重篤 非重篤 非重篤 重篤 重篤 重篤	回復 回復 回復 軽快 軽快 未回復	2日 2日 4日 358日(中止354日) 922日(中止918日) 827日(中止823日)	関節リウマチ 関節痛 心房細動 脂質異常症 肺結核 骨粗鬆症 変形性関節症 腎機能障害
49	女性	50	150 150 150 150	マイコプラズマ性肺炎 注射部位疼痛 発熱 帯状疱疹 発熱	重篤 非重篤 非重篤 非重篤 非重篤	回復した が後遺症 あり 不明 不明 回復 不明	8日 - - 246日(再開217日) -	関節リウマチ 糖尿病 高血圧 脂質欠乏症 肝機能異常
50	男性	50	150	帯状疱疹	重篤	回復	24日	関節リウマチ 糖尿病 不眠症 良性前立腺肥大症 神経因性膀胱 帯状疱疹(既往歴)
51	女性	80	100	大腸菌性肺炎	重篤	回復	79日	関節リウマチ 顔面部神経痛 白内障 糖尿病 高血圧 脂質異常症 間質性肺疾患 気管支肺炎アスペルギルス症 腰部脊柱管狭窄症 脊椎すべり症 喘息 歯周炎 高尿酸血症 便秘 胃食道逆流性疾患 骨粗鬆症 慢性胃炎 胆石症 腎機能障害 B型肝炎抗体陽性
52	女性	80	50 50	誤嚥性肺炎 ブドウ球菌性肺炎	重篤 重篤	回復 回復	123日 123日	関節リウマチ 誤嚥
53	女性	70	150 150 150 150	食道カンジダ症 食道カンジダ症 肝機能異常 胆道仙痛	重篤 重篤 非重篤 重篤	回復 回復 回復 回復	17日 169日(再開127日目) 230日(中止61日目)	関節リウマチ 胃食道逆流性疾患 上腹部痛 慢性腎臓病 肝機能異常 腎機能障害
54	女性	80	100 - - 100 100 100 100	脊椎圧迫骨折 尿路感染 敗血症 転倒 尿路性敗血症 尿路感染 大腿骨骨折	重篤 重篤 重篤 重篤 重篤 非重篤 重篤	回復 死亡 死亡 回復 回復 回復 回復	70日 - - 140日 275日 274日 523日	関節リウマチ 腎機能障害 高血圧 高尿酸血症 水痘(既往歴) 尿閉 骨粗鬆症

No.	性別	年齢 (歳代)	各有害事象発現 時の 本剤投与量(mg)	有害事象名	重篤性	転帰	本剤投与開始から 事象発現までの期間	原疾患・合併症
55	男性	70	150 150	COVID-19 心筋虚血	重篤 重篤	回復 回復	98日 671日(再開533日)	関節リウマチ 心筋梗塞(陣旧性、ステント留置) 慢性腎臓病 糖尿病 間質性肺疾患(両側、すりガラス陰影、網状影を伴う) 脊椎圧迫骨折 腎機能障害 C型肝炎 高尿酸血症 胸水 水痘(既往歴) 胆石症 膵萎縮 ヘリコバクター性胃炎 医療機器使用部位関節感染(左人工膝)(既往歴) 心臓液貯留 慢性心不全
56	女性	60	150 150 150	処置後感染 貧血 白血球数減少	重篤 重篤 非重篤	回復 回復 回復	112日 169日 85日	関節リウマチ 肝炎ウイルスキャリアー
57	女性	70	- - - - - -	ほてり そう痒症 動悸 細菌性関節炎 頸部腫瘍 上腕骨骨折	非重篤 非重篤 非重篤 重篤 重篤 重篤	回復 回復 回復 回復 回復 軽快	4日 4日 4日 127日 127日 1054日(中止1052日)	関節リウマチ 高血圧 骨粗鬆症 胃食道逆流性疾患 心房細動 不眠症 頸腕症候群 膵炎 慢性腎臓病 帯状疱疹(既往歴) 女性乳癌(既往歴) 扁桃周囲腫瘍(既往歴) 腎機能障害 動悸 薬剤アレルギー(レボフロキサシン、セフジニル、セフカペンピボキシル塩酸塩)
58	女性	60	150	帯状疱疹	重篤	回復した が後遺症 あり	349日	関節リウマチ 腎機能障害
59	女性	80	150 100	帯状疱疹	重篤	回復	26日	関節リウマチ
60	女性	80	50 50	尿路感染 敗血症	重篤 重篤	死亡 死亡	994日 994日	関節リウマチ 水痘(既往歴) 不眠症
61	女性	60	150 150	腎盂腎炎 肝機能異常	重篤 非重篤	回復 回復	31日 301日	関節リウマチ 混合性結合組織病 腎機能障害 間質性肺疾患 高血圧 骨粗鬆症 糖尿病 高脂血症 静脈血栓症
62	女性	80	150 150 - 150	口腔内扁平上皮癌 骨壊死 処置後感染 根尖肉芽腫	重篤 重篤 重篤 非重篤	不明 回復 回復 回復	344日(再開59日目) 179日 267日(休薬29日目) 235日(再開8日目)	関節リウマチ 胃食道逆流性疾患 骨粗鬆症 鉄欠乏性貧血 変形性関節症 関節周囲炎 高血圧 脂質異常症 腰部脊柱管狭窄症 骨壊死 肝嚢胞感染(既往歴)
63	女性	80	100 100 -	肺炎 帯状疱疹 膵嚢胞肺炎	重篤 非重篤 重篤	回復 回復 回復	60日(再投与4日目) 32日 250日(中止191日目)	関節リウマチ 緊張性膀胱 うっ血性心不全 葉酸欠乏 深部静脈血栓症 慢性胃炎 狭心症 胃食道逆流性疾患 骨粗鬆症 鉄欠乏性貧血 不眠症 便秘 高血圧
64	不明	60	150	COVID-19	重篤	回復	-	関節リウマチ
65	女性	不明	-	肺炎	重篤	不明	-	-
66	女性	70	150 100 100 150 150 150	関節障害 敗血症 尿路感染 尿路感染 大腿骨骨折 大腿骨頸部骨折	重篤 重篤 重篤 重篤 重篤 重篤	回復 死亡 死亡 回復 回復 回復	433日 1239日(再開264日) 1239日(再開264日) 963日 275日 423日	腎障害 糖尿病 高血圧 甲状腺機能低下症 関節リウマチ 腎機能障害
67	女性	60	150	蜂巣炎	重篤	回復	57日	関節リウマチ 足変形 高血圧 骨粗鬆症

No.	性別	年齢 (歳代)	各有害事象発現 時の 本剤投与量(mg)	有害事象名	重篤性	転帰	本剤投与開始から 事象発現までの期間	原疾患・合併症
68	男性	80	150 - - 150 100 150	小脳出血 腎盂腎炎 敗血症 脂質異常症 B型肝炎再活性化 咯血	重篤 重篤 重篤 非重篤 重篤 非重篤	回復した が後遺症 あり 軽快 軽快 回復 回復 回復	195日 531日(中止337日) 531日(中止337日) 183日 36日 98日	関節リウマチ 深部静脈血栓症 高血圧 骨粗鬆症 胃食道逆流性疾患 腎硬化症 B型肝炎再活性化(既往歴) 腎機能障害 慢性腎臓病
69	女性	70	150	腎盂腎炎	重篤	回復	384日	関節リウマチ 狭心症 感染 腎盂腎炎
70	女性	60	100 100 100 100	マイコプラズマ性肺炎 倦怠感 硬膜下血腫 脊柱管狭窄症	重篤 非重篤 重篤 非重篤	回復 回復 回復 軽快	676日(再開95日) 7日 326日(再開276日) 210日(再開160日)	関節リウマチ 全身性エリテマトーデス 原発性胆汁性胆管炎 糖尿病 心房細動 うっ血性心筋症 関節周囲炎 高血圧 脂質異常症 睡眠時無呼吸症候群 慢性胃炎 脊柱管狭窄症 皮脂欠乏症 不眠症 蜂巣炎(既往歴) 細菌性肺炎(既往歴) 帯状疱疹(既往歴) 季節性アレルギー
71	女性	70	150 -	倦怠感 COVID-19肺炎	非重篤 重篤	軽快 死亡	投与約4か月 473日(中止270日)	関節リウマチ 湿疹 そう痒症 肝炎ウイルスキャリアー(既往歴) 腎機能障害 慢性腎臓病 大動脈瘤 変形性脊椎症
72	女性	80	100 100 100	腎結石症 腎盂腎炎 尿路感染	重篤 重篤 重篤	回復 回復 回復	93日 93日 345日	関節リウマチ 甲状腺機能低下症 胃食道逆流性疾患 高尿酸血症 骨粗鬆症 てんかん 重症筋無力症 貧血 腎機能障害 腎結石症 腎盂腎炎 高血圧
73	女性	70	150 - -	肺炎 頭位性回転性めまい 遠隔転移を伴う肺癌	重篤 重篤 重篤	回復 回復 死亡	9日 27日(中止9日目) 342日(中止182日目)	関節リウマチ 慢性閉塞性肺疾患 間質性肺疾患 骨粗鬆症 高血圧 結核菌群検査陽性 背部痛 細菌性肺炎 腎盂腎炎 肺炎
74	男性	70	100 100 100 100 100 100 100 100 - -	急性心不全 胃癌 横紋筋融解症 関節腫瘍 ウイルス性筋炎 急性心不全 脱水 尿閉 気腫性膀胱炎 敗血症性ショック	重篤 重篤 重篤 重篤 重篤 重篤 重篤 重篤 重篤 重篤	回復 回復 回復 回復 回復 回復 回復 回復 未回復 死亡	20日 134日 315日 315日 315日 57日 69日 86日 384日(中止2日目) 388日(中止6日目)	関節リウマチ 腎機能障害 心筋虚血 潜伏結核 慢性腎臓病 慢性心不全 狭心症 高血圧 脂質異常症 良性前立腺肥大症 慢性胃炎 ニューモシスチス・イロベチ肺炎(既往歴) 結核(既往歴) 心不全(既往歴)
75	男性	70	150 150 - -	肺炎 肺炎 肺炎 間質性肺疾患	重篤 重篤 重篤 重篤	回復 回復 回復 回復した が後遺症 あり 回復	152日 313日(再開126日) 481日(中止164日) 570日(中止253日) 948日(中止631日)	関節リウマチ 間質性肺疾患 腰部脊柱管狭窄症 間質性肺疾患(既往歴) 深部静脈血栓症
76	女性	40	150 150 100	憩室炎 悪心 憩室炎	重篤 非重篤 重篤	回復 回復 回復	43日 225日(再開176日) -	関節リウマチ 肝機能異常 シェーグレン症候群 骨粗鬆症 憩室炎(既往歴) 悪心

No.	性別	年齢 (歳代)	各有害事象発現 時の 本剤投与量(mg)	有害事象名	重篤性	転帰	本剤投与開始から 事象発現までの期間	原疾患・合併症
77	女性	50	150	肺膿瘍	重篤	回復	147日	関節リウマチ 糖尿病 高血圧 肝機能異常 脂質異常症
78	男性	50	50 50 50	心房細動 肺炎 胸膜炎	重篤 重篤 非重篤	回復 回復 回復	23日 155日 155日	関節リウマチ 肝炎ウイルスキャリアー 白血球減少症 リンパ球減少症
79	女性	80	100 100 100	脊椎圧迫骨折 肺炎 尿路感染	重篤 重篤 非重篤	回復 回復 回復	679日 877日 393日	関節リウマチ 高尿酸血症 骨粗鬆症 腎機能障害 水痘(既往歴) 慢性閉塞性肺疾患
80	女性	60	- 100 - - 150 150	サイトカインストーム 発熱 中毒性皮疹 敗血症 腎機能障害 動脈硬化症	重篤 非重篤 重篤 重篤 重篤 重篤	軽快 回復 回復 軽快 軽快 回復 未回復	367日(中止9日) 358日 367日(中止9日) 367日(中止9日) 29日 29日	関節リウマチ 全身性エリテマトーデス 骨粗鬆症 高血圧 高コレステロール血症 便秘 胃食道逆流性疾患 慢性腎臓病 腎臓症 不眠症 変形性関節症 肝機能異常 腎機能障害 動脈硬化症 環軸椎亜脱臼 疼痛
81	女性	80	100 150 - 150 - -	血中クレアチンホスホキナーゼ増加 尿路感染 貧血 味覚障害 低ナトリウム血症 下部消化管出血	非重篤 重篤 非重篤 非重篤 重篤 重篤	回復 回復 回復 回復 回復 回復	85日 406日 407日(休業2日) 561日(再開113日) 752日(中止185日) 861日(中止294日)	関節リウマチ 糖尿病 慢性閉塞性肺疾患 狭心症 脊椎圧迫骨折 肺塞栓症 肺塞栓症(既往歴) 腎機能障害 膀胱炎
82	男性	60	150 150 150 150 150 150 150	下痢 肺癌 急性心筋梗塞 細菌性肺炎 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 慢性腎臓病 顕微鏡的多発血管炎 状態悪化	重篤 重篤 重篤 重篤 非重篤 重篤 非重篤 非重篤	軽快 死亡 回復 回復 回復 回復 回復 回復	- 1147日 856日 106日 176日 888日 - -	関節リウマチ 顕微鏡的多発血管炎 慢性閉塞性肺疾患 高血圧 狭心症(既往歴) 大動脈瘤(既往歴) 脳出血(既往歴) 腎機能障害 B型肝炎(既往歴) 慢性腎臓病 脂質異常症 高尿酸血症
83	男性	60	150	マイコプラズマ性肺炎	重篤	回復	41日	関節リウマチ シェーグレン症候群 高尿酸血症 腰部脊柱管狭窄症 神経痛 変形性膝関節症 変形性股関節症 骨粗鬆症 不安障害 慢性胃腸炎 ドライアイ 慢性胃炎 筋強直性ジストロフィー(疑い)
84	男性	60	150	蜂巣炎	重篤	回復	33日	関節リウマチ うつ血性心筋症 高尿酸血症 心房細動 ヘノッホ・シェーライン紫斑病 腎機能障害 蜂巣炎 不眠症
85	女性	50	-	細菌性肺炎	重篤	回復	29日	関節リウマチ 脂肪肝 高血圧 肝機能異常
86	男性	70	150 150 100 100	帯状疱疹 肺腫瘍 COVID-19 発熱	重篤 重篤 非重篤 重篤	回復 未回復 回復 回復	57日 88日 654日(再開72日) -	関節リウマチ 喘息 高血圧 脂質異常症 高尿酸血症 腎機能障害 腎癌(既往歴)
87	女性	80	150	肺炎	重篤	回復	24日	関節リウマチ 腎機能障害 シェーグレン症候群 高コレステロール血症 胃食道逆流性疾患 肝嚢胞

No.	性別	年齢 (歳代)	各有害事象発現 時の 本剤投与量(mg)	有害事象名	重篤性	転帰	本剤投与開始から 事象発現までの期間	原疾患・合併症
88	男性	70	150 -	関節リウマチ COVID-19肺炎	重篤 重篤	不明 回復	14日 212日(中止284日目)	関節リウマチ 糖尿病 慢性腎臓病 高血圧 高コレステロール血症 脂肪肝 帯状疱疹(既往歴) 水痘(既往歴)
89	女性	70	100 150 150 100	細菌性肺炎 肺炎 気胸 間質性肺疾患	重篤 重篤 重篤 重篤	回復 回復 死亡 未回復	263日 754日(再投与467日) 790日(再投与503日) 620日(再投与333日)	関節リウマチ 糖尿病 間質性肺疾患(既往歴) 咳嗽 脂質異常症 間質性肺疾患
90	女性	80	100	頰部膿瘍	重篤	回復	6日	関節リウマチ うっ血性心不全 腎機能障害 慢性腎臓病
91	女性	60	150	腎盂腎炎	重篤	未回復	36日	関節リウマチ 腎結石症 神経痛 肝機能異常 腎機能障害 帯状疱疹(既往歴) 非定型マイコバクテリア感染(既往歴)
92	女性	80	100 100	感染性腸炎 脊椎骨折	重篤 重篤	回復 回復	271日 148日	骨粗鬆症 関節リウマチ 脊椎骨折 腰椎骨折(既往歴) 胃炎(既往歴)
93	男性	40	150 150	硬膜下膿瘍 細菌性髄膜炎	重篤 重篤	不明 不明	77日 77日	関節リウマチ 高脂血症 高血圧
94	女性	70	100 100 100 100 -	慢性閉塞性肺疾患 肺炎 肺炎 発熱 肺炎	重篤 重篤 重篤 非重篤 重篤	回復 回復 回復 不明 死亡	390日 377日 589日 - 607日(中止19日)	関節リウマチ 心筋梗塞(陈旧性) 手根管症候群 腎機能障害 慢性閉塞性肺疾患 慢性心不全 慢性心不全(既往歴)
95	女性	70	150 150	肺炎 気管支炎	重篤 非重篤	回復 回復	183日 120日	関節リウマチ 糖尿病 高血圧 肝臓血管腫 脊椎すべり症 高尿酸血症 骨粗鬆症 鉄欠乏性貧血 心不全 心筋虚血 肺炎(既往歴)
96	男性	80	100 100 100 100 100 100 100 100 -	胸膜炎 肺炎 肺炎 胃腸炎 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 下痢 上腹部痛 胃食道逆流性疾患 呼吸困難	重篤 重篤 重篤 非重篤 非重篤 非重篤 非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復 回復 回復 回復 回復 回復 回復した が後遺症 あり	602日(再々再開271日) 602日(再々再開271日) 616日(再々再開285日) 310日(再再開48日) 136日 283日(再再開21日) 310日(再再開48日) 313日(再々休業3日) 563日(再々再開232日)	関節リウマチ 自己免疫性甲状腺炎 慢性腎臓病 脱毛症 腎機能障害 肺嚢胞
97	女性	70	150	蜂巣炎	重篤	回復	77日	関節リウマチ 高脂血症 骨粗鬆症 高血圧 末梢性ニューロパシー 胃食道逆流性疾患 蜂巣炎(既往歴)
98	女性	70	150 100 100 100 100	蜂巣炎 大腿骨骨折 脳梗塞 背部痛 発熱	重篤 重篤 重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 軽快 回復 回復	29日 135日 - 119日 695日	関節リウマチ 骨粗鬆症 蜂巣炎 高血圧 脂質異常症 ヘルペス後神経痛 便秘 痒疹 持続性隆起性紅斑 背部痛 過角化 帯状疱疹(既往歴) 肺の悪性新生物(既往歴)
99	女性	60	50 50 50 50 -	薬物過敏症 脱水 胃炎 上気道の炎症 肺炎	重篤 重篤 重篤 重篤 重篤	回復 回復 回復 回復 回復	21日 21日 21日 21日 23日(中止2日目)	関節リウマチ 腎機能障害 胃炎 腸炎

No.	性別	年齢 (歳代)	各有害事象発現 時の 本剤投与量(mg)	有害事象名	重篤性	転帰	本剤投与開始から 事象発現までの期間	原疾患・合併症
100	男性	70	150	蜂巣炎	重篤	回復	-	関節リウマチ 腎機能障害 高血圧 間質性肺疾患 骨粗鬆症 肝嚢胞 鉄欠乏性貧血 十二指腸潰瘍 高尿酸血症 肝酵素異常 リンパ球数減少 高脂血症 間質性肺疾患(既往歴) B型肝炎(既往歴)
101	男性	70	150 150	肺炎 多汗症	重篤 非重篤	不明 回復	350日 1日	関節リウマチ 高血圧 口内乾燥 細菌性肺炎(既往歴)
102	女性	60	100 - - - - - -	COVID-19 腸炎 心不全 尿路感染 心不全 高炭酸ガス血症 感染	重篤 重篤 重篤 重篤 重篤 重篤 重篤	回復 回復 未回復 未回復 死亡 死亡 未回復	62日 156日(中止92日目) 186日(中止122日目) 192日(中止128日目) 194日(中止130日目) 194日(中止130日目) 204日(中止140日目)	関節リウマチ 腎機能障害 高血圧 慢性心不全 甲状腺機能低下症 腎障害 B型肝炎ウイルス検査陽性 浮動性めまい 心房細動 不眠症
103	男性	70	- 150 150 150	肺炎 前立腺炎 間質性肺疾患 体調不良	重篤 重篤 重篤 非重篤	回復 回復 回復 不明	- 15日 36日 -	関節リウマチ 肺機能検査値低下 結腸癌(既往歴) 間質性肺疾患 慢性閉塞性肺疾患 高血圧 ニューモシチス・イロペチイ肺炎(既往歴) 腎機能障害 慢性腎臓病 b型肝炎ウイルスキャリアー(既往歴)
104	女性	70	100	肺炎	重篤	死亡	201日	関節リウマチ 胃食道逆流性疾患 水痘(既往歴) B型肝炎(既感染)
105	女性	60	150 150 150	懸室炎 上咽頭炎 頭位性回転性めまい	重篤 非重篤 重篤	回復 回復 回復	620日(再開565日) 41日目 265日(再開210日)	関節リウマチ 胃食道逆流性疾患 高血圧 骨粗鬆症 脂質異常症 乳癌(既往歴) 浮動性めまい
106	男性	80	-	肺炎	重篤	死亡	548日(中止380日)	関節リウマチ 腎機能障害 高尿酸血症 帯状疱疹
107	男性	70	- -	敗血症 細菌性関節炎	重篤 重篤	死亡 死亡	24日(中止7日目) 24日(中止7日目)	関節リウマチ 高血圧 痛風 腎機能障害
108	女性	70	100 100 100 - - - - 100	末梢神経麻痺 血中クレアチニン増加 胸水 気胸 胸水 肺炎 COVID-19 副鼻腔炎	非重篤 非重篤 非重篤 重篤 重篤 重篤 重篤 非重篤	回復 回復 軽快 回復 未回復 回復 回復 回復	99日 132日 137日 512日(中止79日) 585日(中止152日) 435日(中止2日) 720日(中止287日) 137日	関節リウマチ シェーグレン症候群 原発性胆汁性胆管炎 骨粗鬆症 2型糖尿病 高血圧 慢性閉塞性肺疾患 白内障 胸水 副鼻腔炎 甲状腺機能低下症 アレルギー性皮膚炎 黄色爪症候群
109	女性	70	- 150	COVID-19肺炎 貧血	重篤 非重篤	回復 回復	445日(中止320日) 126日	関節リウマチ 糖尿病 骨粗鬆症 ニューモシチス・イロペチイ肺炎(既往歴) 肝機能異常 腎機能障害 B型肝炎
110	男性	80	100	慢性中耳炎	重篤	回復	70日	関節リウマチ 直腸癌 腰部脊柱管狭窄症 難聴 B型肝炎抗体陽性 緊張性膀胱 椎間ヘルニア 腎結石症 便秘 慢性中耳炎 直腸癌(既往歴)

No.	性別	年齢 (歳代)	各有害事象発現 時の 本剤投与量(mg)	有害事象名	重篤性	転帰	本剤投与開始から 事象発現までの期間	原疾患・合併症
111	女性	70	100 100	肝膿瘍 菌血症	重篤 重篤	回復 回復	25日 25日	関節リウマチ 肝囊胞感染(既往歴) 心不全 狭心症 肝膿瘍(既往歴) 肝機能異常 腎機能障害 脊柱管狭窄症 疼痛 肝囊胞
112	女性	60	150 - - 150 150	大腸炎 ブドウ球菌感染 膿瘍 医療機器関連感染 帯状疱疹 帯状疱疹	重篤 重篤 重篤 重篤 非重篤 非重篤	回復 軽快 軽快 回復 回復 回復	196日 879日(中止2日) 879日(中止2日) 879日(中止2日) 232日 投与約1年2か月後	関節リウマチ 骨粗鬆症 胃食道逆流性疾患 高血圧 爪の皮膚糸状菌症
113	女性	70	100 100 100	関節リウマチ ニューモシスチス・イロベチ肺炎 尿路感染	重篤 重篤 非重篤	回復 回復 回復	17日 - 17日	関節リウマチ 全身性エリテマトーデス 高血圧 塞栓症 腎機能障害
114	男性	70	100 -	間質性肺疾患 細菌性肺炎	重篤 重篤	回復 死亡	149日 335日(中止40日目)	関節リウマチ 糖尿病 間質性肺疾患 脊柱管狭窄症 胃食道逆流性疾患 骨粗鬆症 心筋梗塞(陳旧性) 高血圧 便秘 甲状腺機能低下症
115	女性	50	100	肺炎	重篤	軽快	-	関節リウマチ
116	男性	40	100	細菌性扁桃炎	重篤	回復	12日	関節リウマチ
117	女性	80	150 -	腎盂腎炎 胃穿孔	重篤 重篤	回復 回復	99日 326日(中止228日目)	関節リウマチ 高血圧 腰部脊柱管狭窄症 糖尿病 骨粗鬆症 大動脈弁閉鎖不全症 変形性脊椎症 尿閉 脂質異常症 胃食道逆流性疾患 脳梗塞 肝機能異常 腎機能障害 B型肝炎
118	女性	70	100 100 100 100 100 100 -	誤嚥性肺炎 嚥下障害 栄養障害 悪液質 認知症 上気道の炎症 上腕骨骨折 挫傷 転倒	重篤 重篤 重篤 重篤 重篤 非重篤 非重篤 非重篤 非重篤	死亡 未回復 未回復 未回復 不明 不明 回復 回復 回復	534日 523日 534日 534日 - - 162日 162日 162日	関節リウマチ 骨粗鬆症 口内炎 便秘
119	女性	80	100 100 150 100 -	軟骨石灰化症 肺炎 帯状疱疹 結晶性関節障害 ニューモシスチス・イロベチ肺炎	重篤 重篤 非重篤 非重篤 重篤	軽快 軽快 回復 回復 不明	163日(再開25日) 205日(再開67日) 124日 148日(再開10日) -	関節リウマチ シェーグレン症候群 骨粗鬆症 高血圧 慢性腎臓病 胃癌(既往歴) 肺結核(既往歴) B型肝炎(既往歴) 腎機能障害
120	女性	80	100 100 100	脱水 尿路感染 熱中症	重篤 重篤 重篤	回復 回復 回復	84日 84日 84日	関節リウマチ 慢性腎臓病 腎機能障害 高血圧 腎性貧血 高尿酸血症 神経痛 大腿骨骨折(既往歴) 骨粗鬆症 気管支炎 間質性肺疾患 鉄欠乏性貧血 間質性肺疾患(既往歴)
121	男性	90	50 50	誤嚥性肺炎 塞栓性脳梗塞	重篤 重篤	死亡 軽快	315日目 223日目	関節リウマチ 変形性関節症 骨粗鬆症 腰部脊柱管狭窄症 腎機能障害 珪肺症
122	女性	90	100	腎盂腎炎	重篤	不明	37日	関節リウマチ 認知症 腎機能障害

No.	性別	年齢 (歳代)	各有害事象発現 時の 本剤投与量(mg)	有害事象名	重篤性	転帰	本剤投与開始から 事象発現までの期間	原疾患・合併症
123	男性	80	- 100	誤嚥性肺炎 リンパ球数減少	重篤 非重篤	死亡 回復	155日(中止90日目) 66日(再開22日目)	関節リウマチ 骨粗鬆症 腎機能障害 間質性肺疾患 間質性肺疾患(既往歴)
124	女性	70	150 150	発熱 感染	重篤 重篤	回復 回復	6日 6日	関節リウマチ 高血圧 筋肉痛
125	男性	70	150 150 150 150 150 150	COVID-19肺炎 C-反応性蛋白増加 発熱 消化不良 血中副甲状腺ホルモン増加 坐骨神経痛	重篤 非重篤 非重篤 非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復 回復 回復 軽快	854日 120日 120日 622日 636日 944日	関節リウマチ 腎機能障害 慢性腎臓病 高血圧 高尿酸血症 肺炎腫 椎間板炎 高リン血症 慢性心不全 胃炎 便秘 鉄欠乏性貧血 腎性貧血 骨粗鬆症 帯状疱疹(既往歴) 椎間板炎(既往歴) 肝炎ウイルスキャリアー(既往歴) 胃食道逆流性疾患 副甲状腺機能亢進症
126	女性	70	150 100 100 150	突然死 末梢動脈瘤破裂 帯状疱疹 鉄欠乏性貧血	重篤 重篤 重篤 非重篤	死亡 死亡 回復 軽快	423日(再開367日) 423日(再開367日) 28日 351日(再開295日)	関節リウマチ シェーグレン症候群 高血圧 慢性胃炎 骨粗鬆症 便秘 腎機能障害
127	女性	50	150 150 150	食道カンジダ症 免疫抑制剤濃度増加 薬物相互作用	重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 不明	7日 19日 -	関節リウマチ 腎機能障害 シェーグレン症候群 間質性肺疾患(既往歴) 混合性結合組織病 胃食道逆流性疾患 慢性腎臓病 高血圧 骨粗鬆症 食道カンジダ症
128	女性	60	150 150 150 150 -	転倒 圧迫骨折 血中トリグリセリド増加 肋骨骨折 肺炎	非重篤 非重篤 非重篤 非重篤 重篤	不明 回復 回復 回復 回復	- 242日 29日 357日 750日(中止310日)	関節リウマチ 角膜炎 変形性関節症 アレルギー性鼻炎 末梢性ニューロパチー
129	女性	60	150	帯状疱疹	重篤	回復	36日	関節リウマチ 骨粗鬆症 原発性胆汁性胆管炎 高血圧 肝炎ウイルスキャリアー(既往歴)
130	女性	70	50 100 100 - -	低ナトリウム血症 顎骨壊死 出血 感染 急性腎障害	重篤 重篤 重篤 重篤 重篤	回復 回復 回復 死亡 死亡	383日 208日 208日 830日(中止447日) 830日(中止447日)	関節リウマチ 慢性腎臓病 糖尿病 顎骨壊死 高血圧 肝炎ウイルスキャリアー(既往歴) 腎機能障害
131	男性	60	150 150 150 - -	四肢腫瘍 リンパ球形態異常 リンパ球数減少 誤嚥性肺炎 尿路感染	重篤 非重篤 非重篤 重篤 重篤	回復 回復 軽快 回復 回復	312日(再開86日) 85日 213日(再開10日) 613日(中止299日) 625日(中止311日)	関節リウマチ 慢性肺炎 骨粗鬆症 肺炎腫 HTLV-1キャリア 末梢気道病変 四肢腫瘍(既往歴)
132	男性	70	50 100 - - 100	出血性腸憩室 挫傷 血尿 細菌性肺炎 転倒	重篤 非重篤 非重篤 重篤 非重篤	回復 回復 軽快 死亡 回復	96日 36日 186日(中止5日) 244日(中止63日) -	関節リウマチ 間質性肺疾患 糖尿病 骨粗鬆症 憩室炎 腎機能障害 ヘモグロビン減少 排尿困難 高血圧 脳梗塞(既往歴) 大腸ポリープ(既往歴) 良性前立腺肥大症(既往歴) 間質性肺疾患(既往歴) ヘモグロビン減少(既往歴) 無力症
133	女性	60	150	食道カンジダ症	重篤	不明	120日	関節リウマチ 胃食道逆流性疾患 骨粗鬆症 食道カンジダ症(既往歴)

No.	性別	年齢 (歳代)	各有害事象発現 時の 本剤投与量(mg)	有害事象名	重篤性	転帰	本剤投与開始から 事象発現までの期間	原疾患・合併症
134	女性	80	- 150	ニューモンスチス・イロペチ肺炎 浮動性めまい	重篤 非重篤	回復 回復	843日(中止398日) 27日	関節リウマチ 腎機能障害 ヘルペス後神経痛 腎疾患による浮腫 高血圧 筋痙攣 低カリウム血症 脂質異常症 横紋筋融解症 慢性腎臓病 蛋白尿 胃食道逆流性疾患 帯状疱疹(既往歴) 肺結核(既往歴) 横紋筋融解症(既往歴) 肝炎ウイルスキャリアー(既往歴) 起立性低血圧
135	男性	30	150	肺炎	重篤	回復	207日	関節リウマチ
136	男性	80	50	肺炎	重篤	回復した が後遺症 あり	149日	関節リウマチ B型肝炎 腎機能障害
137	男性	80	50	誤嚥性肺炎	重篤	死亡	657日	関節リウマチ 高血圧 腎機能障害 慢性腎臓病 貧血 慢性疾患
138	男性	50	150	蜂巣炎	非重篤	回復	12日	関節リウマチ
139	男性	80	100	蜂巣炎	重篤	回復	418日	関節リウマチ
140	女性	90	50 50 50 50 50 50 50 50 50 -	腎性貧血 貧血 誤嚥性肺炎 皮膚剥脱 転倒 創傷 尿路感染 便秘 マラスムス	重篤 非重篤 重篤 非重篤 非重篤 非重篤 非重篤 非重篤 非重篤 重篤	回復 回復 回復 回復 回復 回復 回復 回復 回復 死亡	203日 119日 191日 82日 191日 191日 5日 5日 532日	関節リウマチ 爪の皮膚糸状菌症 皮脂欠乏性湿疹 下痢 腎性貧血 変形性関節症 側弯症 高血圧 骨粗鬆症 副甲状腺機能低下症 不眠症 間質性肺疾患(既往歴) 腎機能障害 慢性腎臓病 C型肝炎 甲状腺機能低下症
141	女性	50	150 -	リンパ球数減少 尿路感染	重篤 重篤	回復 回復	24日 804日	関節リウマチ てんかん 骨粗鬆症 高コレステロール血症
142	女性	70	100	B型肝炎再活性化	重篤	回復	22日	関節リウマチ 慢性B型肝炎 肝機能異常
143	女性	70	100 100	肺炎 感染性胸水	重篤 重篤	死亡 死亡	- -	関節リウマチ
144	女性	60	150 150 100 150	蜂巣炎 胃腸炎 悪心 急性腎障害	重篤 重篤 非重篤 重篤	回復 回復 回復 回復	224日(再開189日目) 224日(再開189日目) 22日 224日(再開189日目)	関節リウマチ 骨粗鬆症 高血圧 便秘 不眠症 リンパ増殖性障害 結核 腎機能障害
145	女性	50	100 100 100	咽頭炎 ノロウイルス性胃腸炎 下痢	非重篤 重篤 非重篤	回復 回復 回復	132日 203日 337日(再開130日)	関節リウマチ 高血圧 脂肪肝 帯状疱疹(既往歴) 子宮頸部癌(既往歴)
146	男性	60	100 100 100	遠隔転移を伴う小細胞肺癌 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 細菌性肺炎	重篤 非重篤 重篤	死亡 回復 軽快	- 56日 376日	関節リウマチ 糖尿病性腎症 糖尿病 不眠症 腎機能障害 小細胞肺癌
147	女性	50	-	ヘルペス性状湿疹	重篤	不明	-	-
148	女性	80	100	感染性滑液包炎	重篤	回復	96日	関節リウマチ 糖尿病 認知症 骨粗鬆症 肺結核(既往歴) 腎機能障害 慢性腎臓病
149	男性	50	150	術後創感染	重篤	回復	64日(再開17日目)	関節リウマチ スチル病 良性単クローン性高γグロブリン血症 骨粗鬆症
150	女性	50	-	肺膿瘍	重篤	不明	-	関節リウマチ

No.	性別	年齢 (歳代)	各有害事象発現 時の 本剤投与量(mg)	有害事象名	重篤性	転帰	本剤投与開始から 事象発現までの期間	原疾患・合併症
151	男性	50	150	医療機器関連感染	重篤	回復	28日	関節リウマチ 心室性頻脈 心筋梗塞 糖尿病 高コレステロール血症 ヘルペス後神経痛 変形性脊椎症 帯状疱疹(既往歴) 腎機能障害
152	女性	70	150 150 150 150 150 150	帯状疱疹 注射部位疼痛 発熱 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 発熱	重篤 非重篤 非重篤 非重篤 非重篤 非重篤	回復 不明 不明 回復 回復 不明	36日 - - 232日 344日(再開62日) -	関節リウマチ 高血圧 胃食道逆流性疾患 骨粗鬆症 腎機能障害 リンパ球数減少 白血球数減少 鉄欠乏性貧血
153	女性	70	150 150 150	頭部損傷 肺炎 貧血	重篤 重篤 非重篤	回復 回復 回復	48日 48日 218日(再開141日)	関節リウマチ 縦隔の良性新生物 腎機能障害 骨粗鬆症
154	女性	70	150	帯状疱疹	重篤	回復	500日	関節リウマチ
155	女性	60	150 150 150 150 150	再発乳癌 貧血 帯状疱疹 食欲減退 低ナトリウム血症	重篤 非重篤 重篤 重篤 重篤	未回復 回復 回復 回復 回復	246日 132日 271日 286日(再開8日) -	関節リウマチ 甲状腺機能亢進症 高血圧 放射線肝炎 乳癌 骨粗鬆症 帯状疱疹(既往歴) 乳癌(既往歴) ニューモシスチス・イロペチ肺炎(既往歴) B型肝炎(既往歴)
156	女性	70	150	四肢腫瘍	重篤	回復	21日	関節リウマチ B型肝炎表面抗体陽性 胆石症 慢性胆嚢炎 甲状腺機能低下症 冠動脈硬化症 高血圧 胃食道逆流性疾患 胃潰瘍 四肢腫瘍(左大腿部筋層下腫瘍術後) 慢性C型肝炎 B型肝炎コア抗体陽性
157	女性	60	150 150 150 150 150	細菌性肺炎 細菌性肺炎 好中球数減少 白血球数減少 回転性めまい	重篤 重篤 非重篤 非重篤 重篤	回復 回復 回復 回復 回復	462日 525日(再開50日) 164日 364日 93日	関節リウマチ プリンツメタル狭心症 高血圧 脂質異常症 喘息 骨壊死 便秘 葉酸欠乏 骨粗鬆症 腎機能障害
158	女性	70	150	ウイルス性腸炎	重篤	回復	452日	関節リウマチ 胃食道逆流性疾患 高血圧
159	女性	80	150 100 150	胃癌 非定型マイコバクテリア肺炎 白血球減少症	重篤 重篤 重篤	軽快 未回復 軽快	209日 35日 399日	関節リウマチ 心房細動 脂質異常症 骨粗鬆症 裂孔ヘルニア 鉄欠乏性貧血 腎機能障害 肝炎ウイルスキャリアー 胃癌 大腸ポリープ 膵憩室
160	女性	70	-	ニューモシスチス・イロペチ肺炎	重篤	死亡	-	関節リウマチ 糖尿病 高尿酸血症 骨粗鬆症 脊椎圧迫骨折 頻尿 高血圧 喘息 帯状疱疹(既往歴) 腎機能障害
161	男性	60	150	帯状疱疹	重篤	回復	183日	関節リウマチ 間質性肺疾患 心筋梗塞 腎機能障害 帯状疱疹(既往歴) 肺炎(既往歴)

No.	性別	年齢 (歳代)	各有害事象発現 時の 本剤投与量(mg)	有害事象名	重篤性	転帰	本剤投与開始から 事象発現までの期間	原疾患・合併症
162	女性	80	150	椎間板炎	重篤	回復	76日	関節リウマチ 椎間板炎 骨粗鬆症 慢性腎臓病 高血圧 疼痛 便秘 腎機能障害 腰部脊柱管狭窄症
163	女性	60	100	COVID-19	重篤	回復	-	関節リウマチ
164	男性	60	100 100 100 100	尿路感染 病原体耐性 敗血症性ショック リンパ腫	重篤 重篤 重篤 重篤	回復 回復 回復 回復	19日 22日 22日 59日(休業32日目)	関節リウマチ 高尿酸血症 高血圧 貧血 高脂血症 帯状疱疹(既往歴) 肝機能異常 腎機能障害 前立腺炎
165	女性	10	100 100 150 100	再発急性骨髄性白血病 血管デバイス感染 麻痺性イレウス 敗血症	重篤 重篤 重篤 重篤	死亡 回復 回復 回復	33日 52日 158日 161日	慢性移植片対宿主病 ステロイド糖尿病 血小板数減少 気管支肺炎スベルギルス症 胃腸出血 下痢(難治性下痢) 高血圧 腎機能障害 胃十二指腸潰瘍 サイトメガロウイルス感染 鉄過剰 栄養補給障害 骨粗鬆症 疼痛 汎血球減少症 急性骨髄性白血病 全身性浮腫 低アルブミン血症 低γグロブリン血症 敗血症 医療機器関連感染 不眠症 麻痺性イレウス 水痘(既往歴) 急性骨髄性白血病(既往歴) 気管支肺炎スベルギルス症(既往歴) サイトメガロウイルス感染(既往歴) 敗血症(既往歴) 好中球減少症(既往歴) リンパ球減少症(既往歴) 貧血(既往歴) 血小板減少症(既往歴) 肝機能異常 下痢(水溶性下痢)
166	女性	70	150 - -	糸球体濾過率減少 ヘルピクスター感染 肺結核	非重篤 非重篤 重篤	回復 回復 死亡	113日 567日(中止406日) 826日(中止665日)	関節リウマチ 骨粗鬆症 ステロイド糖尿病 高血圧 腎機能障害 脂質異常症
167	男性	70	150	蜂巣炎	重篤	回復	-	関節リウマチ 狭心症
168	女性	70	150	化膿性筋炎	重篤	回復	33日	関節リウマチ リウマチ性多発筋痛 大動脈弁狭窄 慢性腎臓病 深部静脈血栓症 高血圧 脂質異常症 肝炎ウイルスキャリアー 鉄欠乏性貧血 腎機能障害
169	男性	80	150	COVID-19	重篤	回復	596日	関節リウマチ 腎機能障害 パーキンソン病 骨粗鬆症 背部痛 便秘 慢性腎臓病 腎性貧血 血中β-D-グルカン陽性(原因不明) B型肝炎(既往歴)
170	女性	50	150 150	感染性関節炎 COVID-19	重篤 非重篤	回復 回復	334日 711日(再開370日)	関節リウマチ 筋痙縮 胸郭出口症候群
171	女性	80	150 150	膀胱炎 悪心	重篤 非重篤	回復 回復	112日 176日	関節リウマチ 胃食道逆流性疾患 高コレステロール血症 高尿酸血症 骨粗鬆症 腎機能障害 悪心

No.	性別	年齢 (歳代)	各有害事象発現 時の 本剤投与量(mg)	有害事象名	重篤性	転帰	本剤投与開始から 事象発現までの期間	原疾患・合併症
172	女性	80	100 100	带状疱疹 急性腎盂腎炎	重篤 重篤	回復 回復	364日 364日	関節リウマチ 脂質異常症 骨粗鬆症 ステロイド糖尿病 甲状腺機能低下症 緊張性膀胱
173	男性	60	100	関節腰痛	重篤	回復	-	関節リウマチ 血栓性脳梗塞
174	男性	80	- 100	肺扁平上皮癌 肺炎	重篤 重篤	死亡 回復	582日(中止393日) 186日	関節リウマチ 気管支拡張症 高血圧 脂質異常症 冠動脈疾患 胃癌(既往歴) アスペルギローマ(既往歴) 間質性肺疾患(既往歴)
175	女性	不明	150 150 150 150	带状疱疹 白血球数減少 リンパ球数減少 ヘルペス後神経痛	重篤 非重篤 非重篤 非重篤	不明 回復 不明 不明	- - - -	関節リウマチ
176	女性	50	150 150 150 150 150 150	带状疱疹 神経痛 リンパ球数減少 単純ヘルペス 息詰まり感 状態悪化	重篤 重篤 非重篤 非重篤 非重篤 非重篤	回復 軽快 回復 回復 軽快 軽快	155日 148日 92日 78日 92日 92日	関節リウマチ リンパ球数減少 带状疱疹 ニューモシステス・イロペチ肺炎(既往歴) 不眠症 薬物性肝障害 浮腫 低カリウム血症 軟便 ドライアイ 脂質欠乏症 骨粗鬆症 高血糖 アレルギー性結膜炎 結膜炎 息詰まり感
177	男性	70	100 -	体調不良 肺炎	重篤 重篤	不明 回復	- 620日	関節リウマチ 末期腎疾患 高血圧 B型肝炎 腎機能障害
178	男性	80	100 100	COVID-19 COVID-19肺炎	重篤 重篤	死亡 死亡	- -	関節リウマチ 皮膚筋炎 糖尿病 骨粗鬆症 高脂血症 腎機能障害 带状疱疹(既往歴) COVID19感染症 肺陰影(既往歴)
179	男性	80	100	带状疱疹	重篤	回復	65日	関節リウマチ 間質性肺疾患 良性前立腺肥大症
180	女性	90	100 100 100	COVID-19肺炎 転倒 大腿骨頸部骨折	重篤 重篤 重篤	回復 回復した が後遺症 あり 回復した が後遺症 あり	490日 151日 151日	関節リウマチ 坐骨神経痛 慢性腎臓病 糖尿病 高血圧 腎機能障害 慢性腎臓病 甲状腺機能低下症(既往歴)
181	女性	70	150 150 150	肺炎 脂質異常症 血中クレアチンホスホキナーゼ増加	重篤 非重篤 非重篤	軽快 未回復 軽快	709日 71日 44日	関節リウマチ 腎機能障害
182	女性	60	100	带状疱疹	重篤	回復	743日	関節リウマチ
183	男性	90	100 100 -	慢性心不全 敗血症 肺炎	重篤 重篤 重篤	回復 回復 死亡	31日 35日 99日(中止42日)	関節リウマチ 慢性心不全 心房細動 糖尿病 骨粗鬆症 B型肝炎 慢性腎臓病 腰部脊柱管狭窄症 腎機能障害 貧血 便秘 不眠症 高尿酸血症 低アルブミン血症

No.	性別	年齢 (歳代)	各有害事象発現 時の 本剤投与量(mg)	有害事象名	重篤性	転帰	本剤投与開始から 事象発現までの期間	原疾患・合併症
184	女性	70	-	肺炎	重篤	回復	424日(中止256日)	関節リウマチ 骨粗鬆症 脊椎圧迫骨折 椎骨圧迫骨折 シェーグレン症候群 白血球数減少 リンパ球数減少 低カリウム血症 高血圧 不眠症 胃炎 便秘 帯状疱疹(既往歴) 間質性肺疾患
185	男性	60	50 100 50	肝膿瘍 肝障害 全身性真菌症	重篤 非重篤 重篤	死亡 軽快 不明	97日 13日 73日	関節リウマチ 肝機能異常 肝膿瘍 2型糖尿病 直腸癌(既往歴) 腎結石症 脂肪肝 肝機能異常(既往歴) 胆管拡張 間質性肺疾患 胆管狭窄
186	女性	70	150 150	腎盂腎炎 血中クレアチンホスホキナーゼ増加	重篤 非重篤	回復 回復	347日 351日	関節リウマチ 水痘(既往歴)
187	女性	80	100 100	蜂巣炎 血中クレアチンホスホキナーゼ増加	重篤 非重篤	回復 回復	118日 15日	関節リウマチ 腎機能障害 骨粗鬆症 過角化
188	女性	80	150	感染性脊椎炎	重篤	不明	約8ヶ月	関節リウマチ 腎機能障害
189	女性	60	- 150 150	COVID-19 下痢 感覚鈍麻	重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復	708日(中止681日) 2日 -	関節リウマチ 季節性アレルギー 血管脂肪腫 脂質異常症 脊椎すべり症 腎機能障害 筋痙縮 足変形
190	女性	60	150	腎盂腎炎	重篤	回復	337日	関節リウマチ 尿路結石 尿路感染 2型糖尿病 狭心症 脊椎すべり症 腎機能障害
191	女性	50	- - 150 150 150	細菌性髄膜炎 貧血 上肢骨折 下肢骨折 帯状疱疹	重篤 重篤 重篤 重篤 非重篤	回復 回復 回復 回復 回復	65日(中止17日) 67日(中止19日) 47日 47日 205日(再開38日)	関節リウマチ 腎機能障害 腎アミロイドーシス 腎不全 胃食道逆流性疾患 便秘 高血圧 シェーグレン症候群
192	男性	60	150	尿路感染	重篤	回復	40日	関節リウマチ 骨粗鬆症 高血圧 高尿酸血症 鉄欠乏性貧血 尿路感染(既往歴)
193	女性	70	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	関節膿瘍 関節膿瘍 関節腫脹 浮動性めまい 注射部位疼痛 注射部位そう痒感 帯状疱疹 紅斑 紅斑 女性外陰部潰瘍	重篤 重篤 非重篤 非重篤 非重篤 非重篤 非重篤 非重篤 非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復 回復 不明 不明 回復 回復 回復 回復	29日 投与約7ヶ月 投与約7ヶ月 投与8か月頃 不明 不明 120日 29日 投与約7ヶ月 120日	関節リウマチ 不眠症 胃潰瘍 骨粗鬆症 便秘 アレルギー性鼻炎 鉄欠乏性貧血 上気道の炎症 帯状疱疹(既往歴) 敗血症性ショック(既往歴) 大腸穿孔(既往歴) 腎機能障害
194	男性	60	100	壊疽	重篤	不明	127日	関節リウマチ 高尿酸血症 腎機能障害
195	女性	50	150 150	帯状疱疹 血中カルシウム増加	重篤 非重篤	回復したが後遺症あり 軽快	投与開始約3か月後 125日(再開1日)	関節リウマチ 原発性副甲状腺機能亢進症 骨粗鬆症 肺腫瘍(既往歴) 高カルシウム血症
196	女性	60	100	腎盂腎炎	重篤	回復	13日	関節リウマチ 尿路感染 膀胱炎
197	女性	50	150 150	帯状疱疹 好中球数減少	重篤 非重篤	回復 回復	776日 389日	関節リウマチ 肝機能異常(既往歴)

No.	性別	年齢 (歳代)	各有害事象発現 時の 本剤投与量(mg)	有害事象名	重篤性	転帰	本剤投与開始から 事象発現までの期間	原疾患・合併症
198	女性	70	- -	COVID-19肺炎 帯状疱疹	重篤 非重篤	回復 軽快	655日(中止365日) 669日(中止379日)	関節リウマチ 骨粗鬆症 肝炎ウイルスキャリアー リンパ球数減少 貧血 腎機能障害 ブドウ球菌感染(既往歴)
199	女性	80	150	憩室炎	重篤	軽快	-	関節リウマチ
200	女性	80	150 150 150 150	肺炎 肺炎 肺炎 胃腸出血	重篤 重篤 重篤 重篤	回復 回復 未回復 回復	182日 486日(再開282日) 715日(再開217日) 77日	関節リウマチ 高血圧 高尿酸血症 浮動性めまい 便秘 腰部脊柱管狭窄症 骨粗鬆症 胃癌(既往歴) 肺炎(既往歴) 小脳梗塞(既往歴) 腎機能障害 B型肝炎(既往歴)
201	女性	80	-	肺炎	重篤	死亡	655日(中止566日)	関節リウマチ 肝機能異常
202	女性	70	100 -	顔面麻痺 感染性胸水	重篤 重篤	回復 回復	16日 584日(中止564日)	関節リウマチ 肺線維症 高血圧 骨粗鬆症 ネフローゼ症候群 結核(既往歴) 腎機能障害
203	女性	80	100 - - 100	尿路感染 大動脈弁狭窄 心不全 椎間板炎	重篤 重篤 重篤 重篤	死亡 死亡 死亡 死亡	26日 57日 57日 46日	関節リウマチ
204	女性	70	100	頸部腰痛	重篤	回復	280日	関節リウマチ 高血圧 腎機能障害
205	女性	80	150	肺炎	重篤	回復	144日	関節リウマチ 骨粗鬆症
206	女性	80	150 150 150 150 150	胆管細胞癌 肝転移 肺転移 胆嚢炎 肝感染	重篤 重篤 重篤 重篤 重篤	不明 不明 不明 軽快 軽快	約7ヶ月 約7ヶ月 約7ヶ月 約10ヶ月 約10ヶ月	糖尿病 関節リウマチ 高血圧 胆石症 脂質異常症 慢性腎臓病 腎機能障害
207	女性	80	150	顎腰痛	重篤	軽快	-	-
208	女性	80	100 100 100	骨壊死 脊椎圧迫骨折 COVID-19肺炎	重篤 重篤 重篤	不明 不明 死亡	107日 167日 646日	関節リウマチ 腎機能障害 間質性肺疾患 高血圧 骨粗鬆症 水痘(既往歴)
209	男性	50	150 150	感染性心膜炎 レンサ球菌感染	重篤 重篤	回復 回復	9日 9日	関節リウマチ 高血圧 歯感染
210	女性	50	-	帯状疱疹	重篤	回復	-	皮膚筋炎 間質性肺疾患 関節リウマチ
211	男性	60	- 150	敗血症性ショック 高カリウム血症	重篤 重篤	死亡 回復	449日(中止30日) 416日	関節リウマチ 2型糖尿病 心房細動 胃食道逆流性疾患 間質性肺疾患 高血圧 末梢性ニューロパチー 鉄欠乏性貧血
212	女性	70	- -	B型肝炎再活性化 B型肝炎DNA測定陽性	重篤 非重篤	軽快 軽快	415日(中止228日) 415日(中止228日)	腎機能障害 関節リウマチ B型肝炎ウイルスキャリアー
213	女性	80	100	非定型マイコバクテリア肺炎	重篤	回復	193日	関節リウマチ 腎機能障害
214	女性	80	150	菌血症	重篤	回復	666日	関節リウマチ 腎機能障害
215	男性	70	100 100	COVID-19 皮膚潰瘍	重篤 重篤	回復 回復	- -	末梢動脈閉塞性疾患 関節リウマチ 皮膚潰瘍
216	女性	80	150 -	大腸穿孔 真菌性肺炎	重篤 重篤	死亡 死亡	46日 58日(中止13日)	関節リウマチ 胃食道逆流性疾患 水痘(既往歴) ニューモシチス・イロペチ肺炎(既往歴) 心筋梗塞(既往歴) 腎機能障害 肝炎ウイルスキャリアー

No.	性別	年齢 (歳代)	各有害事象発現 時の 本剤投与量(mg)	有害事象名	重篤性	転帰	本剤投与開始から 事象発現までの期間	原疾患・合併症
217	男性	40	150 150 150	蜂巣炎 皮膚潰瘍 尋麻疹	重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復	471日 268日 310日	関節リウマチ 自己免疫性溶血性貧血 脳梗塞 神経痛 不眠症 骨髄炎(既往歴) リウマチ性血管炎 神経系障害
218	女性	40	150 150	ウイルス性胃腸炎 悪心	重篤 非重篤	回復 回復	120日 57日	関節リウマチ 高コレステロール血症 片頭痛 胃炎 白癬感染 卵巣機能不全
219	女性	70	100 100 100 100	腱断裂 尿路感染 リンパ球数減少 血中尿素増加	重篤 重篤 非重篤 非重篤	不明 回復 回復 不明	345日 338日 66日 178日	関節リウマチ 大球性貧血
220	女性	80	100	肺炎	重篤	回復	113日	関節リウマチ
221	女性	70	150	B型肝炎再活性化	重篤	軽快	4日	関節リウマチ 肝機能異常 腎機能障害 喘息 慢性呼吸疾患 高血圧 脂肪肝 骨粗鬆症 胃食道逆流性疾患
222	女性	90	150	腹膜炎	重篤	回復	795日	消化管穿孔 関節リウマチ 胃食道逆流性疾患 腎硬化症 腎機能障害
223	女性	90	100 100	腎機能障害 糖尿病性壊疽	重篤 重篤	回復した が後遺症 あり 回復した が後遺症 あり	197日 197日	関節リウマチ 糖尿病 末梢動脈閉塞性疾患 高血圧 腎機能障害 C型肝炎
224	女性	60	- 150 - - - - 150	心房細動 細菌性肺炎 細菌性肺炎 敗血症性ショック 帯状疱疹 呼吸不全 帯状疱疹	重篤 重篤 重篤 重篤 非重篤 重篤 非重篤	回復 回復 回復した が後遺症 あり 回復 回復 軽快 回復	122日(休薬54日) 69日 99日(休薬31日) 117日(休薬49日) 79日(休薬11日) 117日(休薬49日) 287日(再開160日)	関節リウマチ 脊椎圧迫骨折 慢性胃炎 鉄欠乏性貧血 骨粗鬆症 脂質異常症 便秘 胃食道逆流性疾患 不眠症 高血圧 間質性肺疾患(既往歴) 肝機能異常 裂孔ヘルニア 易感染性亢進 虫垂炎 胆石症 副鼻腔炎 ボーエン病 脊椎圧迫骨折 腎臓障害 器質性肺炎 間質性肺疾患
225	男性	80	- 150	COVID-19肺炎 血小板数減少	重篤 非重篤	死亡 回復	518日(中止484日) 35日	関節リウマチ 潜伏結核 間質性肺疾患 貧血
226	女性	60	150	帯状疱疹	重篤	回復	60日	脂肪肝(既往歴) 骨粗鬆症(既往歴) 高血圧(既往歴) 慢性B型肝炎(既往歴)
227	女性	60	150	COVID-19	重篤	回復	526日	関節リウマチ 抗合成酵素症候群 シェーグレン症候群 アレルギー性鼻炎 骨粗鬆症 胃食道逆流性疾患 脂質異常症 好酸球性気管支炎 間質性肺疾患 腎機能障害 浮腫
228	女性	50	-	帯状疱疹	重篤	不明	-	1型糖尿病 尿管間質性腎炎 腎機能障害
229	男性	70	150	肺炎	重篤	軽快	88日	関節リウマチ 易感染性亢進
230	男性	80	150	シュードモナス性肺炎	重篤	回復	22日	関節リウマチ 大動脈瘤 前立腺癌 間質性肺疾患 前立腺癌(既往歴) 慢性閉塞性肺疾患

No.	性別	年齢 (歳代)	各有害事象発現 時の 本剤投与量(mg)	有害事象名	重篤性	転帰	本剤投与開始から 事象発現までの期間	原疾患・合併症
231	女性	70	- 150	腎臓痛 発熱	重篤 非重篤	回復 回復	273日(中止259日) 15日	心筋梗塞(陈旧性) 大動脈瘤 関節リウマチ
232	女性	80	- 150 - -	誤嚥性肺炎 赤血球数減少 認知症 嚥下障害	重篤 非重篤 重篤 重篤	回復した が後遺症 あり 回復 未回復 未回復 未回復	306日(中止6日目) 120日 - -	関節リウマチ 骨粗鬆症
233	女性	70	50	肺炎	重篤	不明	-	関節リウマチ
234	女性	80	50 - - 50	メレナ 腹痛 大動脈解離 誤嚥性肺炎	重篤 重篤 重篤 重篤	軽快 不明 死亡 不明	31日 63日 164日 45日	関節リウマチ 認知症 脳梗塞 心筋梗塞 うっ血性心不全 高血圧 胃腸出血 関節炎(既往歴) 脳梗塞 誤嚥性肺炎(既往歴)
235	女性	不明	-	肺炎	重篤	回復	-	関節リウマチ
236	女性	80	150	帯状疱疹	重篤	回復	69日	関節リウマチ 肝炎ウイルスキャリアー 水痘(既往歴)
237	女性	80	100	腎臓痛	重篤	回復	540日	関節リウマチ 糖尿病 慢性腎臓病 高コレステロール血症 高血圧 リンパ増殖性障害(既往歴) 腎機能障害
238	男性	70	100 100 100 100 100 100	嘔吐 肺炎 上気道の炎症 肝酵素上昇 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 血中クレアチンホスホキナーゼ増加	重篤 重篤 非重篤 非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復 回復 回復 回復	1241日 1241日 102日 77日 147日 533日	関節リウマチ 心筋梗塞 脂質異常症 糖尿病 高血圧
239	女性	70	150	蜂巣炎	重篤	回復	133日	関節リウマチ C型肝炎 胆石症 高血圧 うつ病 腎機能障害
240	男性	50	- 150 150 150 150	低酸素症 SARS-CoV-2検査陽性 COVID-19肺炎 血小板数減少 血中尿素増加	重篤 重篤 重篤 非重篤 非重篤	回復 軽快 軽快 回復 未回復	438日(休業9日) 430日 438日(休業9日) 84日 56日	関節リウマチ うつ病 非アルコール性脂肪肝 十二指腸潰瘍修復 狭心症 高クレアチン血症 神経因性膀胱 高血圧 ニューモシスチス・イロペチ肺炎(既往歴) 腎機能障害 慢性腎臓病 肺炎(既往歴) 脱水 過敏性腸症候群
241	女性	70	50 50	胃腸炎 悪心	重篤 非重篤	回復 回復	82日 1日	関節リウマチ 糖尿病 脂質異常症 高脂血症 高血圧
242	男性	80	-	帯状疱疹	重篤	回復	75日(中止47日)	関節リウマチ 慢性腎臓病 狭心症 腎機能障害
243	女性	10	100	腎盂腎炎	重篤	回復	14日	関節リウマチ
244	女性	60	150 150 150	頸部膿瘍 脱水 腎機能障害	重篤 非重篤 重篤	回復 回復 未回復	631日 253日 253日	関節リウマチ 高血圧 慢性腎臓病 腎機能障害
245	女性	70	150	肺炎	重篤	死亡	439日	関節リウマチ 高血圧 心房細動 脂質異常症 不眠症 肝機能異常 狭心症 糖尿病 肝機能異常
246	男性	70	150	腰筋膿瘍	重篤	不明	-	-
247	男性	70	- 150	ニューモシスチス・イロペチ肺炎 発熱	重篤 非重篤	回復 回復	82日(中止17日) 66日	関節リウマチ B型肝炎 高尿酸血症 高脂血症 腎機能障害 帯状疱疹(既往歴)

No.	性別	年齢 (歳代)	各有害事象発現 時の 本剤投与量(mg)	有害事象名	重篤性	転帰	本剤投与開始から 事象発現までの期間	原疾患・合併症
248	男性	80	100	肺炎	重篤	回復	163日	関節リウマチ 肺気腫 心房細動 高血圧 脂質異常症 便秘 間質性肺疾患 前立腺癌(既往歴) 肺の悪性新生物(既往歴) 胃癌(既往歴)
249	男性	80	-	敗血症	重篤	死亡	437日(中止241日)	関節リウマチ 腎機能障害 心房細動 狭心症 高尿酸血症 骨粗鬆症 胃食道逆流性疾患 糖尿病 腎性貧血 便秘 不眠症 下肢切断(既往歴)
250	女性	70	100	COVID-19肺炎	重篤	死亡	697日(中止368日)	関節リウマチ 肺炎(既往歴) 敗血症(既往歴) 脳梗塞(既往歴) 脳梗塞 高血圧 慢性胃炎 坐骨神経痛 皮膚炎 腎機能障害
251	男性	80	50	肺炎	重篤	軽快	89日	肺炎 関節リウマチ 肝機能異常
252	女性	80	100 100 100 100 100 100	癌胎児抗原増加 便潜血陽性 菌血症 直腸穿孔 腹膜穿孔 直腸癌	重篤 重篤 重篤 重篤 重篤 重篤	不明 不明 不明 不明 不明 不明	286日 286日 372日(再開10日) 372日(再開10日) 372日(再開10日) 372日(再開10日)	関節リウマチ 骨粗鬆症 補助人工心臓使用者 貧血 腎機能障害 肺結核 肝炎ウイルスキャリアー
253	女性	90	150 - - 150 150 -	COVID-19肺炎 ムコール症 真菌感染 陰部ヘルペス 口腔ヘルペス COVID-19	非重篤 重篤 重篤 非重篤 非重篤 重篤	回復 死亡 死亡 不明 不明 死亡	413日 478日(中止6日) 478日(中止6日) 474日(中止2日) 474日(中止2日) 478日(中止6日)	関節リウマチ 腎機能障害 高血圧 胃食道逆流性疾患 骨粗鬆症 甲状腺機能低下症 うっ血性心不全 うっ血病
254	男性	70	- 150 150 150 150 -	腸閉塞 大腸穿孔 骨盤膿瘍 腹膜炎 带状疱疹 関節痛	重篤 重篤 重篤 重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復 回復 回復 回復	427日(中止49日) 379日(再開309日) 379日(再開309日) 379日(再開309日) 59日 421日(中止43日)	関節リウマチ 骨粗鬆症 慢性胃炎 筋痙攣 腎結石症 腎機能障害 肺炎(既往歴) 尿管結石症
255	女性	80	100 -	出血性十二指腸潰瘍 細菌性敗血症	重篤 重篤	死亡 死亡	418日 441日(中止24日)	関節リウマチ 慢性腎臓病 易感染性汎進 糖尿病 高血圧 うっ血性心不全 続発性副甲状腺機能亢進症 肝機能異常 腎機能障害
256	女性	70	150	带状疱疹	重篤	軽快	147日	関節リウマチ 高コレステロール血症 2型糖尿病 骨粗鬆症
257	女性	60	150	蜂巣炎	重篤	回復	212日	関節リウマチ
258	女性	80	-	带状疱疹	重篤	回復	792日(中止618日目)	関節リウマチ
259	女性	80	150 -	インフルエンザ性肺炎 急性心不全	重篤 重篤	回復 死亡	18日 147日(中止130日)	関節リウマチ 腎機能障害 心臓弁膜疾患 慢性腎臓病 B型肝炎(既往歴) 大動脈弁疾患
260	女性	80	150	細菌性肺炎	重篤	回復	461日	関節リウマチ 敗血症(既往歴) 腎機能障害 脊椎圧迫骨折 腰部脊柱管狭窄症 慢性腎臓病 間質性肺疾患

No.	性別	年齢 (歳代)	各有害事象発現 時の 本剤投与量(mg)	有害事象名	重篤性	転帰	本剤投与開始から 事象発現までの期間	原疾患・合併症
261	女性	不明	100	COVID-19	重篤	回復	-	関節リウマチ 胃食道逆流性疾患 骨粗鬆症 脂質異常症 高尿酸血症 変形性脊椎症 高血圧 慢性腎臓病 脳梗塞 脳梗塞(既往歴) 不眠症 腎性貧血 腎機能障害
262	女性	70	- 150 150	免疫再構築炎症反応症候群 ニューモシチス・イロベチ肺炎 サイトメガロウイルス血症	重篤 重篤 重篤	回復 回復 回復	- - -	関節リウマチ
263	女性	80	150	肺炎	重篤	軽快	-	-
264	女性	70	- - - - - - - - - - - -	帯状疱疹性髄膜炎 帯状疱疹 皮脂欠乏性湿疹 過角化 足部白癬 低アルブミン血症 下痢 上咽頭炎 肝障害 複視	重篤 重篤 非重篤 非重篤 非重篤 非重篤 非重篤 非重篤 非重篤 非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復 回復 回復 未回復 未回復 回復 回復 軽快 未回復	594日(中止199日) 594日(中止199日) 約14(中止約1)ヶ月 約14(中止約1)ヶ月 約1年8ヶ月(中止8ヶ月) 761日(中止366日) 約2年2ヶ月 約2年7ヶ月 約2年7ヶ月 1062日(中止667日)	関節リウマチ 帯状疱疹(既往歴) B型肝炎(既往歴) 鉄欠乏性貧血 強皮症 蜂巣炎 足部白癬 緊張性膀胱 硬化性胆管炎 胆石症 B型肝炎ウイルス検査陽性 肺陰影 胃食道逆流性疾患 帯状疱疹 骨粗鬆症 高脂血症 腰部脊柱管狭窄症
265	女性	80	150	腹壁膿瘍	重篤	回復	-	関節リウマチ
266	女性	80	150	敗血症性ショック	重篤	死亡	672日(中止70日)	関節リウマチ 慢性気管支炎 慢性腎臓病 ネフローゼ症候群 貧血 骨粗鬆症 甲状腺機能低下症 高脂血症 爪の皮膚糸状菌症 胃食道逆流性疾患 高カリウム血症 高尿酸血症 高血圧 腎機能障害
267	女性	70	100	B型肝炎再活性化	重篤	不明	701日	関節リウマチ 肝炎ウイルスキャリアー(既往歴) 骨粗鬆症 高血圧 小脳梗塞 間質性肺疾患
268	男性	70	100	四肢膿瘍	重篤	軽快	-	関節リウマチ
269	男性	70	100	COVID-19	重篤	回復	640日	関節リウマチ 高尿酸血症
270	女性	60	-	肺炎	重篤	回復	80日(中止24日)	関節リウマチ 甲状腺機能亢進症 糖尿病 帯状疱疹(既往歴) 肝機能異常 腎機能障害
271	女性	70	-	肺炎	重篤	死亡	691日(中止678日)	関節リウマチ 脂質異常症 緑内障 高血圧 骨粗鬆症 便秘 高尿酸血症 肺炎(既往歴) 腎機能障害
272	女性	不明	150	肺炎	重篤	回復	734日	関節リウマチ 高血圧 脊椎圧迫骨折 アレルギー性鼻炎 乳癌(既往歴) 肺炎(既往歴)
273	女性	80	-	骨髄炎	重篤	回復	80日	関節リウマチ
274	男性	70	100	肺炎	重篤	死亡	278日	関節リウマチ 末期腎疾患 糖尿病 不安定狭心症 脳梗塞 高血圧 結核(既往歴) 腎機能障害

No.	性別	年齢 (歳代)	各有害事象発現 時の 本剤投与量(mg)	有害事象名	重篤性	転帰	本剤投与開始から 事象発現までの期間	原疾患・合併症
275	女性	70	150	敗血症性ショック	重篤	回復した が後遺症 あり	1031日	関節リウマチ 変形性脊椎症 骨粗鬆症 胃食道逆流性疾患 腎機能障害 乳癌(既往歴)
276	女性	不明	150	敗血症	重篤	回復	-	関節リウマチ
277	女性	70	150 150	大腸穿孔 後腹膜膿瘍	重篤 重篤	死亡 死亡	238日 238日	関節リウマチ 延髄外側症候群 糖尿病 高血圧 脂質異常症 不眠症 肝機能異常
278	男性	80	-	肺炎	重篤	回復	-	-
279	女性	80	150	COVID-19	重篤	不明	-	関節リウマチ
280	女性	50	150	蜂巣炎	重篤	回復	72日	関節リウマチ 骨粗鬆症 脂質異常症 胃潰瘍 群発頭痛
281	女性	不明	-	COVID-19	重篤	回復	315日(中止204日)	関節リウマチ 高血圧 2型糖尿病 高脂血症 骨粗鬆症 脊柱管狭窄症 脳出血(既往歴) 慢性色素性紫斑(既往歴) 肝機能異常
282	女性	70	-	蜂巣炎	重篤	回復	413日(中止372日)	関節リウマチ 静脈瘤 動脈硬化症 緊張性膀胱 そう痒症 高血圧 肺炎(既往歴)
283	女性	80	-	COVID-19	重篤	回復	685日(中止634日)	関節リウマチ 骨粗鬆症 高血圧 脂質異常症 心筋梗塞 非定型マイコバクテリア感染 心筋梗塞(既往歴) 腎機能障害
284	男性	80	-	肺炎	重篤	死亡	954日(中止899日)	関節リウマチ 慢性気管支炎 慢性腎臓病 腎機能障害 結腸癌(既往歴)
285	女性	60	150	COVID-19肺炎	重篤	回復	477日	関節リウマチ 腎不全
286	女性	80	50 50	尿路感染 敗血症	重篤 重篤	死亡 死亡	投与約3年5か月 投与約3年5か月	関節リウマチ 腎機能障害 腎障害
287	女性	50	150	帯状疱疹	重篤	回復した が後遺症 あり	38日目	関節リウマチ 腎機能障害 COVID-19肺炎(既往歴)
288	女性	60	150	急性腎盂腎炎	重篤	不明	-	関節リウマチ 線維筋痛
289	女性	90	100 100	肺炎 気管支炎	重篤 非重篤	軽快 回復	- 262日	関節リウマチ 間質性肺疾患 大動脈弁狭窄 腎機能障害 間質性肺疾患(既往歴) 気管支炎
290	女性	50	-	敗血症	重篤	死亡	379日(中止72日)	関節リウマチ 脂質異常症 胃食道逆流性疾患 低カリウム血症 腎臓症
291	女性	80	-	COVID-19	重篤	不明	-	関節リウマチ
292	男性	80	100	肺炎	重篤	回復	664日	関節リウマチ 腎機能障害 糖尿病 高尿酸血症 高脂血症 高血圧 心房細動
293	女性	70	-	細菌性肺炎	重篤	死亡	193日(中止53日)	関節リウマチ 間質性肺疾患 肝機能異常 肺炎(既往歴)
294	女性	70	150	帯状疱疹	重篤	回復	88日	関節リウマチ
295	女性	60	150	帯状疱疹	重篤	未回復	764日	関節リウマチ 骨粗鬆症 間質性肺疾患 水痘(既往歴)

No.	性別	年齢 (歳代)	各有害事象発現 時の 本剤投与量(mg)	有害事象名	重篤性	転帰	本剤投与開始から 事象発現までの期間	原疾患・合併症
296	男性	70	150 150	ニューモシテス・イロペチ肺炎 帯状疱疹	重篤 重篤	回復 回復した が後遺症 あり	651日 651日	関節リウマチ 糖尿病 高血圧 間質性肺疾患(既往歴)
297	女性	60	- -	気胸 マイコバクテリウム・アビウムコンプレックス感 染	重篤 重篤	回復した が後遺症 あり 未回復	627日(中止499日) 627日(中止499日)	関節リウマチ 間質性肺疾患 甲状腺機能低下症 骨粗鬆症 肝炎ウイルスキャリアー
298	男性	80	-	誤嚥性肺炎	重篤	死亡	666日(中止126日)	関節リウマチ 慢性腎臓病 間質性肺疾患 便秘 腎機能障害
299	女性	70	-	細菌性肺炎	重篤	回復	943日(中止510日)	関節リウマチ 慢性副鼻腔炎 骨粗鬆症 慢性胃炎 脂質異常症 皮膚潰瘍
300	女性	60	-	丹毒	重篤	回復	889日(中止876日)	関節リウマチ 胃食道逆流性疾患 アレルギー性鼻炎 脂質異常 胆石症
301	女性	60	100 100	COVID-19肺炎 血中クレアチンホスホキナーゼ増加	重篤 非重篤	軽快 未回復	133日 57日	関節リウマチ 骨粗鬆症 リンパ増殖性障害 腎機能障害
302	女性	60	150	帯状疱疹	重篤	軽快	-	関節リウマチ
303	女性	60	-	全身性カンジダ	重篤	死亡	748日(中止679日)	関節リウマチ 肺気腫 肺炎(既往歴)
304	不明	70	-	肺炎	重篤	不明	-	関節リウマチ
305	不明	80	-	肺炎	重篤	不明	-	関節リウマチ
306	女性	70	150 150 100	ブドウ球菌性菌血症 腰筋膿瘍 帯状疱疹	重篤 重篤 重篤	回復 回復 回復	- - -	骨髄異形成症候群 腎機能障害
307	女性	70	100	肺炎	重篤	軽快	29日	関節リウマチ
308	女性	50	150 150 150 150	急性COVID-19後症候群 COVID-19 血小板数減少 リンパ球数減少	重篤 重篤 重篤 重篤	回復 回復 回復 回復	28日 8日 28日 28日	肝機能異常 関節リウマチ 発育性股関節形成不全 脂質異常症

【症例一覧をご参照いただくときの注意事項】

・ご報告いただいた有害事象名、原疾患・合併症名をICH国際医薬用語集日本語版(MedDRA)の基本語(PT:Preferred Terms)に読み替えて集計しております。

・有害事象の重篤性の評価については、ICH E2Aと同様の考え方に基づいております。

- (1) 死に至るもの
- (2) 生命を脅かすもの
- (3) 治療のための入院又は入院期間の延長が必要であるもの
- (4) 永続的又は顕著な障害・機能不全に陥るもの
- (5) 先天異常・先天性欠損を来すもの
- (6) その他の医学的に重要な状態と判断される事象又は反応